

Műtéti beleegyező nyilatkozat - Sebészi fogeltávolítás

A műtét:

Sebészi fogeltávolításra szükség lehet: ínyszél alá tört fogak esetén, korábbi fogeltávolítás során bent maradt gyökérmaradvány esetén, nagy görbülettel rendelkező gyökök esetén, továbbá ha a fog összezsugorodott a fogmederrel.

Műtét

A műtétet helyi érzéstelenítésben végezzük. A műtét során leválasztjuk a fogínyt a csonttól és fűrő segítségével szabaddá tesszük a fogat. Ezt követően - elhelyezkedéstől, mérettől függően - egy vagy több darabban eltávolítjuk a fogat. A fog eltávolítását követően varratok behelyezésére kerül sor, ezek eltávolítására 7-10 nap múlva történik.

A műtét következményei

A műtétet követően arcduzzanat, szájnítási- nyelési korlátozottság, fájdalom, hőemelkedés jelentkezhet, ezek a panaszok 3-4 nap alatt fokozatosan megszűnnek.

Lehetséges szövődmények

a, Az érzéstelenítés lehetőségei, veszélyei

A helyi érzéstelenítéssel járó szövődmények előfordulása nem gyakori, azonban előfordulhat: arcidegbénulás, vérömleny, szájjár, injekciós tályog, vértelen folt az arcon, kettős látás, idegsérülés.

b, Általános műtéti kockázat

Az orvosi beavatkozások kockázatát a szervezet állapota (pl. fertőzés vagy tumor következtében legyengülés) és az alapbetegségek (cukorbetegség, szívelégtelenség, véralvadási zavar, allergia) befolyásolják. A véralvadást befolyásoló gyógyszerek használata megnövelheti a műtétet követő utóvérzés rizikóját.

c) Ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények a műtét után

Sebgyógyulási zavar: a műtét után a sebszélek keringése nem kielégítő (különösen immunhiányos-, cukorbeteg, vagy dohányos páciensek esetében, a nyálkahártya felől baktériumok kerülhetnek a sebüregbe. Sebfertőzés kialakulása esetén láz és a seb körüli fokozott fájdalom, savós majd gennyes beolvadás jöhet létre, mely akár esetenként intravénás antibiotikus kezelést és helyi fokozott fertőtlenítő sebkezelést tehet szükségessé (kötéscserék, fertőtlenítő átöblítések), olykor sebészi módszerekkel (seb tisztítása, a seb újraegyesítése) lehet kezelni.

Fogorvosi Rendelő

A felső állcsonton végzett fogeltávolítások során esetenként előfordul, hogy a fogak gyökerei benyúlnak az arcüregbe. Ilyen esetben a fogeltávolítást követően az arcüreg megnyílnak a szájüreg felé, esetleg fog vagy gyökérdarabok kerülhetnek az arcüregbe. Az arcüregbe kerülő idegentesteket mihamarabb el kell távolítani, a megnyílt arcüreget pedig műtétilag kell zárni. Tüszentés kerülendő, orrfújás ilyen esetben 6 hétig szigorúan tilos. Sikertelen zárás esetén krónikus arcüreggyulladás és az arc-, és szájüreget összekötő sipoly alakulhat ki. Ennek rendezésére újabb műtétre lehet szükség.

Ritka szövődménynek számít a felső vagy alsó állcsont törése, mely műtétilag vagy konzervatív úton eredményesen kezelhető. Előfordulhat a szomszédos fogak sérülése is.

Az alsó fogak gyökerei - főként mélyen fekvő fogak esetében - az alsó állcsontban haladó ideg csatornájához igen közel eshetnek, így az ideg sérülése az esetek egy részében nem kerülhető el. Ez átmeneti, ritkán maradandó érzéskiesést, zsibbadást okozhat az alsó ajak azonos oldalán. Az ajak mozgásai nem károsodnak.

Ritka szövődmény az alsó állcsont belső felszíne mellett haladó - a nyelvet beidegző - ideg sérülése, mely bekövetkezhet az érzéstelenítés végzése során, de sérülhet a műtét kapcsán is. Ekkor átmeneti vagy tartós zsibbadás, érzés-ízérzés kiesés jelentkezhet az érintett nyelvfelel.

A műtét utáni időszak fontosabb teendői (kb. 3 hét)

- Ne egyen, amíg zsibbad az ajka (2-3 óra); de vizet inni szabad!
- Nem szabad dohányozni legalább két napig. A dohányzás hátráltatja a sebgyógyulást.
- A seb környékét is és a varratokat is óvatosan tisztítsa, a fogakat alaposan fogkefével mossa! Szájöblögető használata javasolt.
- Javasolt az arc hideg borogatása két napig, ez csökkenti az arcduzzanatot. Érdemes a jégzsélét konyharuhába csavarni, így ráhelyezni az arcra kb. 20 percig, majd fél óra szünet után ismét visszahelyezheti.
- Egy hétig javasolt a sportolás, szaunázás, napozás kerülése, továbbá kerülje a nehéz tárgyak emelését, hajolgatást!
- Szükség esetén javasolt fájdalomcsillapító bevétele. A felírt teljes adag antibiotikum beszedése szükséges.

MŰTÉTI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

A beteg kérdései:

Az orvos megjegyzései:

Beleegyező nyilatkozat

A kezelő (műtétet végző) orvosom, Dr. Gyöngyösi Marcell a betegségről, a tervezett műtétről, annak kockázatairól és a lehetséges szövődményekről mindenre kiterjedően, kielégítően tájékoztató. A beszélgetés során megválasztak minden engem foglalkoztató és feltett kérdést. Kijelentem, hogy elolvastam és maradéktalanul megértettem, úgy az írásbeli beteg tájékoztató mint a szóbeli felvilágosítás tartalmát és kijelentem, hogy a műtét beavatkozással kapcsolatban további kérdésem nincs. Elegendő gondolkodási és mérlegelési idő után kérem, hogy a felajánlott műtétet rajtam az orvos végezze el.

2024.11.30. Tatabánya

orvos aláírása

páciens aláírása