

Műtési beleegyező nyilatkozat - Tályogmegnyitás

A műtét:

Tisztelt Páciensünk!

Vizsgálataink alapján Önnél tályogmegnyitás vált szükségessé, melynek célja a váladék lebocsátása, ezáltal a gyulladásos folyamat javulásának elősegítése.

A beavatkozás rövid leírása

A beavatkozás helyi érzéstelenítésben történik. A tályog elhelyezkedésétől függően a beavatkozás vagy a szájon belül vagy a bőr felől történhet. Kiterjedtebb gyulladás esetén általában a külső feltárás javasolt 2-3 cm-es heget hagyva maga után a bőrön.

A nyálkahártyát vagy a bőrt szikével átmetszve a továbbiakban a mélyebb rétegekben (az anatómiai képletek megóvása céljából) már tompán preparálva haladunk a tályogüregig. A tályog üregét elérve, azt megnyitva a váladék kiürül. A váladéktermelés bizonyos ideig még folytatódik, emiatt ha a sebszélek idejekorán záródnának, akkor a tályog újra telődhetne. Ennek megelőzésére steril gézcsíkot helyezünk az incíziós nyílásba, amit több napon keresztül naponta cserélünk és ellenőrizzük. A gyulladásos folyamat lezajlása után a csíkot eltávolítjuk a sebből, így a tályogüregbe vezető nyílás fokozatosan bezáródik. Kiterjedtebb gyulladás esetén a kiürülő gennyből baktérium tenyésztés céljából mintát veszünk és a kapott eredmények alapján az elsődlegesen megkezdett antibiotikum terápiát célzott antibiotikum terápiára válthatjuk. A tályog megnyitását követően párakötést helyezünk fel a gyulladásban lévő területre, ezzel is segítve a gyógyulási folyamatot.

A beavatkozás lehetséges mellékhatásai, veszélyei és szövődményei

a) Tipikus, illetve gyakori jelenségek a beavatkozás után: enyhe fájdalom és ödéma lép fel, melyet gyógyszerekkel csillapítunk. Külső feltárás esetén a bőrön heg marad vissza.

b) Ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények: megsérülhetnek a lágyrészekben futó anatómiai képletek (erek, idegek), ezáltal vérzés, átmeneti vagy végleges érzéskiesés, vagy a mimikai izmok bénulása következhet be.

A gyógyulás várható időtartama és megítélése

A gyógyulás a folyamat súlyosságától (fertőző ágensek), valamint a szervezet védekező reakciójának hatékonyságától függően (cukorbetegségeknél, gyengült immunrendszerű betegeknél ez a reakció lassabb lehet) akár több hétig is elhúzódhat. A metszés helyén kisméretű, maradandó heg keletkezik.

A beavatkozás elhagyásának várható kockázatai

A tályogmegnyitás elmaradásakor esetenként a folyamat súlyosbodhat, akár életveszélyes állapot (pl.: szepszis [vérmérgezés], mellüreg gyulladás, légutak elzáródása stb.) is kialakulhat! Más esetben sipoly képződhet a bőr vagy a nyálkahártya felé, melyen keresztül a váladék, illetve genny a külvilágba ürül, ilyenkor a gyulladásos folyamat elhúzódik, krónikussá válik.



Fogorvosi Rendelő

Különösen fontos, hogy állapotromlás, nyelési vagy légzési nehezítettség esetén azonnal forduljon orvoshoz!

Mint minden gyulladásos állapotban, itt is fontos a lázcsillapítás és a bőséges, napi 2-3 liter folyadék fogyasztása.

MŰTÉTI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

A beteg kérdései:

Az orvos megjegyzései:

Beleegyező nyilatkozat

A kezelő (műtétet végző) orvosom, Dr. Gyöngyösi Marcell a betegségről, a tervezett műtétről, annak kockázatairól és a lehetséges szövődményekről mindenre kiterjedően, kielégítően tájékoztató. A beszélgetés során megválasztak minden engem foglalkoztató és feltett kérdést. Kijelentem, hogy elolvastam és maradéktalanul megértettem, úgy az írásbeli beteg tájékoztató mint a szóbeli felvilágosítás tartalmát és kijelentem, hogy a műtét beavatkozással kapcsolatban további kérdésem nincs. Elegendő gondolkodási és mérlegelési idő után kérem, hogy a felajánlott műtétet rajtam az orvos végezze el.

2024.11.30. Tatabánya

orvos aláírása

páciens aláírása