

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat - Rögzített fogpótlás készítése

A protetikai terv leírása:

A beavatkozás célja

a hiányzó fogazat pótlása, rágófunkció, esztétika helyreállítása

A beavatkozás áttekintése

Első alkalommal a Protetikai terv szerinti fogak előkészítése (preparálása történik), mely során helyet készítünk a későbbi fogpótlásnak. Az első alkalom helyi érzéstelenítésben történik. Lenyomatok készülnek a kiindulási helyzetről, majd a végén a lecsiszolt, preparált fogakról. Rutinszerűen ideiglenes pótlást nem alkalmazunk a nehéz tisztíthatóság miatt, de esztétikai szempontból, illetve, ha hosszabb idő telik el a végleges pótlás elkészültéig (pl. foghúzás miatti várakozás) készülhet ideiglenes pótlás is az első alkalom végén. Általában a második alkalommal szükség van próbára, majd, ha nincs szükség módosításra, újabb próbára a harmadik alkalommal elkészül a fogpótlás. Előre nem tudjuk megígérni, hogy a megbeszélt időpontban biztosan elkészül a pótlás. Előfordulhat, hogy szükségessé válik újabb próba, esetleg valamely részt újra kell készíteni, ami a szükséges időtartamot is növeli.

A beavatkozás előtt többnyire helyi érzéstelenítést alkalmazunk.

A helyi érzéstelenítéssel járó szövődmények előfordulása nem gyakori, azonban előfordulhat: arcidegbénulás, vérömleny, szájszár, injekciós tályog, vértelen folt az arcon, kettős látás, idegsérülés.

A beavatkozás következményei. Mire figyeljen a beavatkozást követően!

Amennyiben kapott érzéstelenítést, az érzéstelenítőszer felszívódásáig (1-3óra), amíg az ajka zsibbad ne egyen, mert az ajkát megharaphatja, súlyos sebet okozva magának. A preparálás a íny szint alá is betérjed, emiatt a preparált fogak mellett enyhe ínyvérzés jelentkezhet, apró ínysebek miatt egyes ételek csíphetik ezeket a területeket. A fogak érzékenyek lesznek hidegre, melegre és érintésre is. Ideiglenes fogpótlás mellett is lehetnek érzékenyek a fogak. Fontos, hogy forró, nagyon hideg ételeket, italokat ne fogyasszon, amíg a fogpótlás nem készült el. Fogak tisztítása a korábbiaknak megfelelő legyen. Tisztítás során szintén érzékenyek a preparált fogak, de az óvatos tisztítása fontos.

A beavatkozás szövődményei

A beavatkozás során sérülhet a szomszédos fogfelszín. Ínyvérzés alakulhat ki. Mélyre terjedő üreg, a preparálás során a fogak nem megfelelő tengelyállása, kopása miatt megnyílhat, illetve károsodhat a fogból, amely után gyökérkezelés válhat szükségessé. Ehhez társultan arcduzzanat, fájdalom jelentkezhet.

A kezelés elmaradása esetén

a nem megfelelő rágófunkció emésztési és rágóizületi problémákhoz, fejfájáshoz vezethet. A hiányos

Fogorvosi Rendelő

fogazattal való rágás miatt kialakulhat a nyaki és hátizomba sugárzó fájdalom és izomfáradtság. A fogak hiánya esztétikai, hangképzési, szociális problémákat okozhat. A szomszédos és szemben levő fogak elmozdulnak a hiány felé, ami nehezíti a későbbi pótlás elkészítését. A hiányzó fog területén lévő csont felszívódik, mely az esetleges implantációs lehetőségeket is csökkenti, illetve nehezíti.

Beleegyező nyilatkozat

A betegtájékoztatót elolvastam és maradéktalanul megértettem. A beavatkozást végző orvos a felmerült kérdéseimre a beavatkozás előtt kielégítően tájékoztatót Kijelentem, hogy a beavatkozással kapcsolatban további kérdésem nincs. Elegendő gondolkodási és mérlegelési idő után kérem, hogy a felajánlott kezelést rajtam a kezelőorvos elvégezze.

2024.11.30. Tatabánya

orvos aláírása

páciens aláírása