

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat - Kombinált fogpótlás készítése

A protetikai terv leírása:

A kombinált fogpótlások készítése a bonyolultsága miatt hosszabb – akár 3-4 hét is lehet. A két rész kapcsolódása nagyban befolyásolja a kivehető rész stabilitását.

A beavatkozás célja

a hiányzó fogazat pótlása, rágófunkció, esztétika helyreállítása

A beavatkozás áttekintése

Ha a fogpótlás készítését fogeltávolítás előzi meg, fontos a megfelelő sebgyógyulási idő kivárása. Minél hosszabb ez az idő, annál szebben gyógyul meg a seb. Ha hamar elkészül a pótlás, kezdetben még gyorsabban változik a foghúzás körüli csontalap, ezért hamarabb veszít stabilitásából a fogsor, hamarabb alá kell bélelni. Általánosságban elmondható, hogy foghúzást követően ajánlott legalább egy hónap várakozás a fogpótlás elkészítéséig.

Első alkalommal a fogak előkészítése történik (csiszolása, további szuvas foganyag ellátása ...). Az előkészített fogcsontokról lenyomat készül a rögzített rész készítéséhez. Rutinszerűen ideiglenes pótlást nem alkalmazunk a nehéz tisztíthatóság miatt, de esztétikai szempontból, illetve, ha hosszabb idő telik el a végleges pótlás elkészültéig (pl. foghúzás miatti várakozás) készülhet ideiglenes pótlás is az első alkalom végén még a rendelőben. Fogtechnikai ideiglenes pótlás is készülhet elsősorban esztétikai célok miatt hosszabb várakozási idő esetén (pl. fogeltávolítás miatt). A preparált felszínek érzékenységeire kell számítani hidegre és érintésre. Hideg és forró ételek, italok fogyasztását kerülni kell.

Több alkalom után elkészül egy próbafogsor. Ennek ellenőrzését követően – amennyiben minden stimmel – következő alkalomra elkészül a fogpótlás. Amennyiben precíziós elhorgonyzású fogpótlásról van szó, a rögzített rész a kivehetővel egyszerre kerül a szájba. A rögzített rész beragasztásra kerül. Ezt követően a kivehető rész megbeszéltek szerint szájban kell, hogy maradjon a ragasztó teljes kötéseig. Mivel ilyenkor nincs lehetőség a fogpótlás kivételének-berakásának a gyakorlására, nehézség esetén a rendelő segítségét kell kérni, nem szabad feszegetni.

A véglegesen felragasztott pótlást – amennyiben annak cseréje szükségessé válik – csak annak roncsolásával, levágásával lehet eltávolítani. Ezt követően új pótlás készítése szükséges.

Előre nem tudjuk megígérni, hogy a megbeszélt időpontban biztosan elkészül a pótlás. Előfordulhat, hogy szükségessé válik újabb próba, esetleg valamely részt újra kell készíteni, ami a szükséges időtartamot is növeli.

A beavatkozás előtt többnyire helyi érzéstelenítést alkalmazunk.

A helyi érzéstelenítéssel járó szövődmények előfordulása nem gyakori, azonban előfordulhat: arcidegbénulás, vérömleny, szájjár, injekciós tályog, vértelen folt az arcon, kettős látás, idegsérülés.

Készült a Dental Pocket szoftverrel!

Fogorvosi Rendelő

A beavatkozás következményei. Mire figyeljen a beavatkozást követően!

Amennyiben kapott érzéstelenítést, az érzéstelenítőszer felszívódásáig (1-3óra), amíg az ajka zsibbad ne egyen, mert az ajkát megharaphatja, súlyos sebet okozva magának. A preparálás a íny szint alá is beterjed, emiatt a preparált fogak mellett enyhe ínyvérzés jelentkezhet, apró ínysebek miatt egyes ételek csíphetik ezeket a területeket. A fogak érzékenyek lesznek hidegre, melegre és érintésre is. Ideiglenes fogpótlás mellett is lehetnek érzékenyek a fogak. Fontos, hogy forró, nagyon hideg ételeket, italokat ne fogyasszon, amíg a fogpótlás nem készült el. Fogak tisztítása a korábbiaknak megfelelő legyen. Tisztítás során szintén érzékenyek a preparált fogak, de az óvatos tisztítása fontos.

A beavatkozás szövődményei

A beavatkozás során sérülhet a szomszédos fogfelszín. Ínyvérzés alakulhat ki. Mélyre terjedő üreg, a preparálás során a fogak nem megfelelő tengelyállása, kopása miatt megnyílhat, illetve károsodhat a fogból, amely után gyökérkezelés válhat szükségessé. Ehhez társultan arcduzzanat, fájdalom jelentkezhet.

A kezelés elmaradása esetén

a nem megfelelő rágófunkció emésztési és rágóizületi problémákhoz, fejfájáshoz vezethet. A hiányos fogazattal való rágás miatt kialakulhat a nyaki és hátizomba sugárzó fájdalom és izomfáradtság. A fogak hiánya esztétikai, hangképzési, szociális problémákat okozhat. A szomszédos és szemben levő fogak elmozdulnak a hiány felé, ami nehezíti a későbbi pótlás elkészítését. A hiányzó fog területén lévő csont felszívódik, mely az esetleges implantációs lehetőségeket is csökkenti, illetve nehezíti.

Tájékoztató a kivehető fogpótlás viseléséhez

Miután elkészül fogpótlás és szájba tette, még fel kell készülnie szájnyálkahártyájának a a fogpótlás kivehető részének hordására. Vagyis akár néhány hét megszokási időre is szükség van (precíziós elhorgonyzás esetén kevesebb). Ezalatt minél többet kell hordani a fogpótlást. Fontos, hogy ha feldörzsöli az ínyét, ne erőltesse a hordást, hanem szóljon nekünk, mert valószínűleg korrigálni kell a fogpótláson. A kivehető fogsorokat -legalábbis részben - a nyálkahártya tartja, ezért következetesen mozognak; szituációtól függ, hogy mennyire (precíziós elhorgonyzás esetén kevésbé).

Hosszabb idő eltelte után (ez függ a korábbi foghúzások gyógyulásától is) lehetséges, hogy a fogpótlás már nem úgy érintkezik a nyálkahártyával/szemközti fogakkal, mint kezdetben. A fogsor megsüllyed. Ekkor szükséges lehet a kivehető rész alábélelése, a megsüllyedt rész feltöltése a fogsor anyagával.

Fontos a rendszeres kontroll vizsgálat / minimum évente/.

Tájékoztató a rögzített rész tisztításához

A beragasztott fogpótlást hasonlóan kell tisztítani a saját fogakhoz fogkefével – elsősorban a fognyaki részre kell figyelni, ahol a korona széle van. Ezen kívül a pótfog alatti terület tisztításának jó eszköze a Superfloss, mely hasonló a fogselyemhez. Keményebb végével lehet a híd alatt átvezetni a szálát, majd puha részével lehet a pótfog és a fogíny közötti területet tisztítani. A szűkebb, fogak/koronák közötti területet hatékonyabban lehet tisztítani a fogköztisztító kefével.

Tájékoztató kivehető fogpótlás tisztításához

Készült a Dental Pocket szoftverrel!

Fogorvosi Rendelő

Étkezés után ki kell venni és meg kell tisztítani a fogpótlást, valamint ínyét puha sörtéjű fogkefével. Alkalmanként pótlását helyezze műfogsortisztító oldatba, majd tisztítsa le fogkefével és öblítse le folyóvízzel.

Beleegyező nyilatkozat

A betegtájékoztatót elolvastam és maradéktalanul megértettem. A beavatkozást végző orvos a felmerült kérdéseimre a beavatkozás előtt kielégítően tájékoztatót. Kijelentem, hogy a beavatkozással kapcsolatban további kérdésem nincs. Elegendő gondolkodási és mérlegelési idő után kérem, hogy a felajánlott kezelést rajtam a kezelőorvos elvégezze.

2024.11.30. Tatabánya

orvos aláírása

páciens aláírása